



#Rosp2020 #vie conventionnelle #rémunération #médecins

## **La Rémunération sur objectifs de santé publique en 2020**

L'année 2020, marquée par la crise sanitaire, a fortement perturbé l'évolution des indicateurs de la Rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp) des médecins.

Afin de corriger les effets de cette situation très atypique, des mesures d'ajustement à la marge du calcul de la Rosp ont été définies avec les représentants des médecins.

### **L'évolution des indicateurs en 2020 influencée par la crise sanitaire**

La crise sanitaire a eu un impact significatif sur les indicateurs Rosp. Le moindre recours aux soins (essentiellement durant le premier confinement) et l'annulation d'activités programmées non urgentes ont ainsi percuté l'évolution de certains indicateurs sans que cela résulte directement d'un changement des pratiques professionnelles des médecins.

Certains indicateurs de la Rosp, notamment ceux liés à des dosages biologiques ou des actes de dépistage, sont ainsi moins bien orientés.

Pour la Rosp médecin traitant de l'adulte, c'est le cas pour la part des patients diabétiques ayant bénéficié d'au moins 2 dosages d'HbA1c dans l'année (- 2,8 points), la part des patients diabétiques ayant bénéficié d'un fond d'œil sur 2 ans et 1 trimestre (- 1,2 point) et le dépistage de la maladie rénale chronique chez le patient diabétique (- 0,9 point). Le suivi des patients sous traitement anti-vitamine K est également en baisse (- 3,6 points).

La même évolution est observée pour les indicateurs de dépistage des cancers : - 3,0 points pour celui du cancer du sein, - 1,6 point pour celui du cancer du col de l'utérus et - 0,4 point pour celui du cancer colorectal (dont le recul - prononcé en milieu d'année - a été partiellement rattrapé).

A noter également : les indicateurs relatifs à la durée de certains traitements ont augmenté (alors que l'évolution attendue doit être à la baisse). C'est le cas des benzodiazépines hypnotiques (+ 1,9 point) et anxiolytiques (+ 0,7 point).

A l'inverse, la crise sanitaire s'est traduite par une bonne orientation de certains indicateurs, comme le taux de couverture de vaccination antigrippale des 65 ans et plus, très fortement en hausse (+ 7,7 points), de même que celui des patients à risque (+ 6,0 points) ou le taux des traitements par antibiotiques chez les patients de 16 à 65 ans et hors ALD (- 8,6 points) en lien avec la forte baisse d'activité constatée lors du premier confinement.

### **Un ajustement limité des modes de calcul**

Afin d'éviter que ces évolutions atypiques des indicateurs, déconnectées des pratiques des médecins, n'aient un impact sur la Rosp, des ajustements limités ont été décidés conjointement avec les syndicats représentatifs des médecins libéraux afin de corriger les effets dus à la crise.

Des coefficients de majoration ont ainsi été appliqués à la rémunération du médecin pour la Rosp médecin traitant de l'adulte et celle médecin traitant de l'enfant, afin de conserver l'effet de l'augmentation de la patientèle médecin traitant.

**La rémunération des seuls médecins généralistes, au titre de la Rosp médecin traitant de l'adulte, représente 258,3 millions d'euros pour 50 733 médecins, soit un montant très proche de 2019** (254,4 millions d'euros pour 50 662 médecins rémunérés), soit un montant moyen de rémunération versée de 5 091 euros par médecin rémunéré (contre 5 021 euros en 2019). La Rosp médecin traitant de l'enfant représente 11,6 millions d'euros.

Deux spécialités, qui ont vu leur patientèle significativement affectée lors des confinements (gastro-entérologues et cardiologues), se sont vues appliquer une clause de sauvegarde exceptionnelle au montant global de la rémunération 2020. Ainsi, 4 412 cardiologues sont rémunérés pour un montant total de 9,2 millions d'euros, et 2 006 gastroentérologues pour un montant total de 2,9 millions d'euros.

**Les rémunérations de la Rosp clinique des médecins libéraux<sup>1</sup> s'élèvent ainsi en 2020 à 279,5 millions d'euros pour 72 098 médecins rémunérés** (contre 275,9 millions d'euros pour 73 582 médecins rémunérés en 2019).

### ***Résultats complets nationaux des Rosp en annexe de ce communiqué***

#### **A propos de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam)**

Etablissement public national à caractère administratif, sous la double tutelle du ministère des Solidarités et de la Santé (chargé de la Sécurité sociale) et du ministère de l'Action et des Comptes publics, la Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam) gère, au niveau national, les branches Maladie et Accidents du travail / Maladies professionnelles du régime général de Sécurité sociale.

Avec plus de 2 200 salariés, elle constitue la tête de pont opérationnelle du régime d'assurance maladie obligatoire en France.

Elle pilote, coordonne, conseille et appuie l'action des organismes locaux qui composent son réseau (CPAM, DRSM, Ugecam, Carsat, CGSS...). Elle mène les négociations avec les professionnels de santé au sein de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam). Elle concourt ainsi, par les actions de gestion du risque ou les services en santé qu'elle met en œuvre, à l'efficacité du système de soins et au respect de l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam). Elle participe également à la déclinaison des politiques publiques en matière de prévention et informe chaque année ses assurés pour les aider à devenir acteurs de leur santé.

#### **Contact presse**

[presse.cnam@assurance-maladie.fr](mailto:presse.cnam@assurance-maladie.fr)

Perrine Carriau - 01 72 60 17 64

Caroline Reynaud - 01 72 60 14 89



[Suivez notre actualité sur Twitter !](#)

---

<sup>1</sup> Sont incluses ici les Rosp médecin traitant de l'adulte, cardiologue et gastroentérologue - hors Rosp centres de santé, endocrinologues et médecin traitant de l'enfant.

## Annexes - Résultats complets nationaux

### 1. Indicateurs cliniques pour les médecins traitants (libéraux)

Indicateurs		Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Evol. en points 2019 - 2020
PREVENTION	Grippe						
	Vaccination antigrippale des 65 ans et plus	52,9 %	52,9 %	55,3 %	56,4 %	64,2%	7,7
	Vaccination antigrippale du sujet à risque	31,2 %	31,2 %	33,3 %	34,9 %	40,9%	6,0
	Dépistage des cancers						
	Dépistage du cancer du sein	67,3 %	66,1 %	66,4 %	66,2%	63,2%	-3,0
	Dépistage du cancer du col	56,9 %	56,8 %	56,1 %	55,0%	53,4%	-1,6
	Dépistage du cancer colorectal***	22,9 %	29,1 %	28,1 %	30,8%	30,5%	-0,4
	Iatrogénie médicamenteuse						
	Patient âgé sous psychotropes	5,3 %	5,0 %	4,8 %	4,6 %	4,5%	-0,1
	Traitement par benzodiazépine hypnotique	41,6 %	40,9 %	42,4 %	41,0 %	42,9%	1,9
	Traitement par benzodiazépine anxiolytique	15,1 %	15,0 %	14,8 %	14,3 %	15,0%	0,7
	Antibiothérapie						
Antibiothérapie des 16-65 ans sans ALD	39,5	36,1	35,8	32,9	24,3	-8,6	
Antibiorésistance	43,2 %	39,5 %	36,9 %	34,7 %	34,7%	-0,1	
SUIVI DES PATHOLOGIES CHRONIQUES	Diabète						
	Nombre de dosages HbA1c chez le diabétique***	79,0 %	78,7 %	79,4 %	79,7 %	76,9%	-2,8
	Fond d'œil chez le diabétique**	62,9 %	62,0 %	65,8 %	68,1 %	67,0%	-1,2
	Dépistage maladie rénale chronique chez le diabétique**	31,0 %	34,9 %	40,9 %	43,4 %	42,5%	-0,9
	HTA						
	Dépistage maladie rénale chronique chez l'hypertendu**	7,0 %	9,0 %	22,3 %	24,8 %	24,6%	-0,2
	Risque cardio-vasculaire						
	Prévention secondaire du risque cardio-vasculaire	44,2 %	43,6 %	43,7 %	43,9 %	44,1%	0,2
Surveillance d'un traitement par anti vitamine K**	79,0 %	80,2 %	85,5 %	84,1 %	80,4%	-3,6	
OPTIMISATION ET EFFICACITE DES PRESCRIPTIONS	Prescription dans le répertoire (ou bio-similaires)						
	Statines prescrites dans le répertoire des génériques	90,3 %	90,7 %	98,1 %	97,0 %	95,4%	-1,6
	Antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques	86,5 %	88,5 %	92,7 %	95,3 %	93,3%	-1,9
	Traitement de l'incontinence urinaire dans le répertoire des génériques	47,1 %	Indicateurs neutralisés				
	Traitement de l'asthme dans le répertoire des génériques	78,9 %					
	Indice global de prescription dans le reste du répertoire*	47,1 %	62,2 %	62,3 %	64,7 %	61,0%	-3,8
	Bio-similaires de l'insuline glargine***	0,2 %	2,8 %	9,1 %	19,7%	26,8%	7,1
	Efficacité des prescriptions						
	Traitement par inhibiteurs de la pompe à protons			30,9 %	30,1 %	30,8%	0,7
	Traitement par ézétimibe			11,0 %	12,0 %	13,5%	1,6
Traitement antiagrégants plaquettaires par aspirine	87,2 %	87,9 %	88,4 %	88,9 %	89,2%	0,3	
Traitement par metformine chez le diabétique de type 2	80,6 %	81,4 %	82,3 %	83,0 %	83,6%	0,6	
Hormonémies thyroïdiennes*	86,7 %	89,1 %	90,7 %	91,0 %	91,1%	0,1	

Décroissants

Déc

\* Formule de calcul de l'indicateur modifiée à compter de décembre 2017.

\*\* Formule de calcul de l'indicateur modifiée à compter de décembre 2018.

\*\*\* Formule de calcul de l'indicateur modifiée à compter de décembre 2019.

## 2. Indicateurs cliniques pour les médecins traitants de l'enfant (libéraux)

	Indicateurs	Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Evol. en points 2019 - 2020
PREVENTION	Vaccination						
	2 doses vaccin ROR chez enfants de - 2 ans	75,7%	78,1%	83,1%	84,3%	85,9%	1,6
	1 dose vaccin antiméningocoque C enfants - 18 mois	75,3%	80,5%	89,2%	95,1%	97,4%	2,3
	Antibiorésistance						
	Part des C3 ou C4 des enfants de - 4 ans traités par antibiotiques	34,0%	27,0%	24,1%	21,3%	20,1%	-1,2
	Part des C3 ou C4 des enfants de + 4 ans traités par antibiotiques	22,8%	19,3%	17,2%	15,2%	14,1%	-1,0
SUIVI PATHOLOGIES CHRONIQUES	Suivi bucco-dentaire						
	Examen bucco-dentaire chez les - 16 ans	76,5%	76,9%	76,9%	77,4%	71,9%	-5,5
	Asthme						
SUIVI PATHOLOGIES CHRONIQUES	Asthme persistant [1-16 ans] traités par CI ou ALT	54,8%	54,1%	53,0%	53,9%	55,5%	1,6
	Asthme persistant [6-16 ans] avec au moins 1 EFR/an	38,4%	39,8%	43,3%	43,2%	41,3%	-1,9

Décr.

## 3. Indicateurs cliniques pour les cardiologues

	Indicateurs	Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Evol. en points 2019 - 2020
PREVENTION	HTA						
	Hypertension artérielle sous trithérapie	68,1%	68,3%	68,5%	69,6%	70,6%	1,0
	Surveillance biologique sous trithérapie anti-HTA	89,4%	90,0%	90,4%	91,4%	91,2%	-0,2
	Iatrogénie						
SUIVI PATHOLOGIES CHRONIQUES	Limiter la durée des traitements antiagrégants	67,9%	66,6%	65,1%	63,3%	61,3%	-1,9
	Infarctus du myocarde						
	Traitement post infarctus du myocarde	34,2%	33,5%	32,2%	32,0%	32,4%	0,4
SUIVI PATHOLOGIES CHRONIQUES	Insuffisance cardiaque						
	Traitement de l'insuffisance cardiaque	63,4%	63,4%	64,1%	65,8%	66,5%	0,7
EFF. PRESC. RIPTIO NS	Prescription dans le répertoire						
	Antihypertenseurs génériques	86,1%	90,9%	93,3%	92,6%	91,8%	-0,8
	Statines génériques	91,2%	95,0%	93,8%	89,9%	84,7%	-5,2

Décr.

#### 4. Indicateurs cliniques pour les gastro-entérologues

		Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Evol. en points 2019 - 2020	
PREVENTION	Dépistage du cancer colorectal							D
	Coloscopie totale avec polypectomie	3,1%	3,7%	3,6%	3,6%	3,5%	-0,1	
	Eradication Helicobacter Pylori							
	Contrôle d'éradication d'Helicobacter Pylori	58,9%	61,3%	63,1%	63,5%	57,1%	-6,4	
SUIVI PATHOLOGIES CHRONIQUES	Cancer colorectal							
	Imagerie après intervention pour cancer colorectal	73,5%	74,9%	77,3%	79,1%	78,7%	-0,4	
	ACE après intervention pour cancer colorectal	27,4%	27,2%	27,2%	28,0%	27,9%	-0,1	
	MICI							
	Protéinurie pour MICI sous 5-ASA	38,4%	38,8%	39,7%	41,0%	39,9%	-1,1	
	NFS-plaquettes pour MICI sous azathioprine	71,2%	70,7%	70,2%	70,8%	67,2%	-3,6	

#### 5. Indicateurs cliniques pour les médecins traitants adultes (centres de santé)

		Résultats à fin déc. 2016	Résultats à fin déc. 2017	Résultats à fin déc. 2018	Résultats à fin déc. 2019	Résultats à fin déc. 2020	Evol. en points 2019 - 2020	
PREVENTION	Grippe							Décroissants
	Vaccination antigrippale des 65 ans et plus	40,1%	40,2%	42,3%	43,9%	50,1%	6,3	
	Vaccination antigrippale du sujet à risque	26,4%	26,7%	29,2%	31,3%	36,1%	4,7	
	Dépistage des cancers							
	Dépistage du cancer du sein	61,1%	59,9%	59,9%	60,2%	57,8%	-2,4	
	Dépistage du cancer du col	50,2%	49,8%	48,9%	47,8%	46,1%	-1,8	
	Dépistage du cancer colorectal***	17,1%	23,7%	23,7%	24,5%	24,9%	0,4	
	Iatrogénie médicamenteuse							
	Patient âgé sous psychotropes	3,0%	2,9%	2,9%	2,7%	2,7%	0,0	
	Traitement par benzodiazépine hypnotique	39,7%	39,1%	41,9%	41,4%	43,4%	2,0	
Traitement par benzodiazépine anxiolytique	13,1%	13,8%	14,0%	13,7%	14,7%	1,1		
Antibiothérapie								
Antibiothérapie des 16-65 ans sans ALD	26,7	24,2	23,6	21,6	15,4	-6,2		
Antibiorésistance	37,6%	36,7%	35,4%	34,2%	33,4%	-0,7		
SUIVI DES PATHOLOGIES CHRONIQUES	Diabète							
	Nombre de dosages HbA1c chez le diabétique***	71,1%	71,2%	72,4%	73,2%	70,5%	-2,7	
	Fond d'œil chez le diabétique**	65,8%	62,2%	66,9%	70,1%	69,7%	-0,3	
	Dépistage maladie rénale chronique chez le diabétique**	41,0%	41,8%	43,2%	44,9%	44,2%	-0,7	
	HTA							
	Dépistage maladie rénale chronique chez l'hypertendu**	12,0%	12,3%	27,1%	28,0%	27,2%	-0,8	
	Risque cardio-vasculaire							
Prévention secondaire du risque cardio-vasculaire	38,5%	38,2%	38,9%	39,4%	39,7%	0,3		
Surveillance d'un traitement par anti vitamine K**	63,1%	68,4%	74,8%	74,3%	74,1%	-0,2		

<b>OPTIMISATION ET EFFICACITE DES PRESCRIPTIONS</b>	<b>Prescription dans le répertoire (ou bio-similaires)</b>							
	Statines prescrites dans le répertoire des génériques	92,5%	92,6%	98,2%	97,3%	95,7%	-1,6	
	Antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques	85,7%	87,7%	92,6%	95,1%	92,9%	-2,2	
	Traitement de l'incontinence urinaire dans le répertoire des génériques	44,4%	Indicateurs neutralisés					
	Traitement de l'asthme dans le répertoire des génériques	71,1%						
	Indice global de prescription dans le reste du répertoire*	44,4%	62,1%	62,4%	65,2%	62,2%	-3,1	
	Bio-similaires de l'insuline glargine***	0,3%	2,6%	6,4%	14,2%	21,5%	7,3	
	<b>Efficiéce des prescriptions</b>							
	Traitement par inhibiteurs de la pompe à protons			36,0%	35,7%	35,6%	0,0	
	Traitement par ézétimibe			8,8%	9,9%	11,4%	1,5	
	Traitement antiagrégants plaquettaires par aspirine	88,2%	89,0%	89,2%	89,5%	90,0%	0,5	
	Traitement par metformine chez le diabétique de type 2	87,5%	87,5%	87,7%	87,9%	88,2%	0,3	
	Hormonémies thyroïdiennes*	78,0%	80,2%	82,6%	84,6%	85,8%	1,2	
								<b>Décr</b>

\* Formule de calcul de l'indicateur modifiée à compter de décembre 2017.

\*\* Formule de calcul de l'indicateur modifiée à compter de décembre 2018.

\*\*\* Formule de calcul de l'indicateur modifiée à compter de décembre 2019.